

111年六甲國中學生接種 BNT疫苗注意事項

疫苗接種相關規定

- ▶ 第一劑和第二劑需間隔**12周**
- ▶ 第二劑和第三劑(追加劑)需間隔**150天(5個月)**
需間隔期滿才能施打
- ▶ 如有感冒症狀或身體不適者暫緩施打
- ▶ 疾管署建議確診者至少間隔3個月再打疫苗
- ▶ 正在居隔者或是密切接觸者暫緩施打
- ▶ 當天未能接種者請逕自至〈台南打疫苗〉系統預約施打

接種日期及地點

日期：111年6月10日 星期(五)

地點：活動中心

各班施打疫苗的時間

時間	13：00~13：30	13：30~14：00
班級	101、102、103、 104	105、201、202、203
時間	14：00~14：30	14：30~15：00
班級	204、205、301、 302	303、304、305、306、 307

到校時間及集合地點

1.各班必須在表定施打疫苗時間的前半小時到校，因為一、二年級要先發放疫苗接種同意書，且必須先量測體溫，然後寫在接種書上。

2.當天到校先在新風雨球場集合

3.統一穿著運動服

疫苗接種前

- 1.要有充足的睡眠
- 2.前一晚不要熬夜
- 3.飲食盡量清淡，水分攝取要足夠。
- 4.疫苗注射前可先補充200-300ml的水分。

疫苗接種當日

1.請按照表定時間，帶著**疫苗接種黃卡**和**健保卡**及**疫苗接種意願書**和一支筆到活動中心，缺一不可。

(黃卡如遺失請至衛生所申請補發，需100元費用)

2.早上及中午務必要吃飽，保持心情愉快，不要過度緊張、恐懼，避免暈針。

3.接種完成後於原位留觀15分鐘，如有不舒服的狀況，現場有119待命。

4.回家後要不要繼續線上上課，視身體狀況而定

疫苗接種後

1.接種後常見反應如注射部位肌肉疼痛、紅腫，少數微發燒、畏寒、疲倦、頭痛為正常現象，一般1-2天後恢復。若局部紅腫，建議冰敷可以改善。

*惟請注意是否有嚴重不良反應(如：持續發燒超過48小時、呼吸困難、心跳加速、全身紅疹不適、胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥..等)，務必立即就醫。

2.施打疫苗後請喝大量開水，2週內勿劇烈運動